

TACO (transfusjonsassosiert volumoverbelastning) er en potensielt alvorlig lungekomplikasjon ved blodtransfusjon, som i stor grad kan forebygges.

Risikoen for å utvikle **TACO** bør evalueres før transfusjonen.

«**TACO sjekkliste**» ved behov for transfusjon med erythrocyttkonsentrat hos ikke blødende pasienter:

Hvis «**ja**» til ett eller flere spørsmål:



Har pasienten hjertesvikt, alvorlig aortastenose eller moderat til alvorlig venstre ventrikkel dysfunksjon?
Bruker pasienten diuretika?
Har pasienten alvorlig anemi?



Har pasienten lungeødem?
Har pasienten lungesyntomer av ukjent årsak?



Har pasienten klinisk signifikant positiv væskebalanse?
Har pasienten fått væsketerapi de siste 24 timene?
Har pasienten perifere ødemer?
Har pasienten hypoalbuminemi?
Har pasienten nyresvikt av betydning?



1 Vurder om transfusjon er nødvendig ut fra risikoen for TACO.

2 Vurder om transfusjon trygt kan utsettes til pasienten er nærmere utredet og behandlet for tilstander som gir økt risiko for TACO.

3 Vurder å gi diuretika før transfusjon. Monitorer vitale parametere under og etter transfusjonen, inkludert O₂-metning. Vurder å tilpasse volumet som skal transfunderes til pasientens kroppsvekt (særlig ved lav kroppsvekt). Gi ett erythrocyttkonsentrat av gangen, og vurder effekten før du eventuelt gir flere.