

# NYTT OM LEGEMIDLER

## Sesonginflensavaksiner 2019/2020

Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. I Norge selges Influvac Tetra, Fluarix Tetra, Vaxigriptetra, og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer

### Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2019/2020:

- En A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
- En A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
- En B/Colorado/06/2017-lignende virusstamme
- En B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme

### Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Vaksine	Type *	Aldersgruppe	Administrasjonsmåte
Influvac Tetra «Mylan Healthcare B.V.»	Inaktivert, overflateantigen	Fra 36 måneder	intramuskulært
Fluarix Tetra «GlaxoSmithKline AS»	Inaktivert, splittvirus	Fra seks måneder	intramuskulært
Vaxigriptetra «Sanofi Pasteur Europe»	Inaktivert, splittvirus	Fra seks måneder	intramuskulært
Fluenz Tetra «AstraZeneca AB»	Levende, svekket	Fra to til 18 år	Nasalt

\* Alle vaksiner er produsert i egg.

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt tiomersal som konserveringsmiddel.

**Legen bør forskrive generisk til alle pasienter unntatt de som ikke skal bruke levende svekket vaksine, for eksempel ved alvorlig immunsvikt.**

### Sesonginflensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

- Alle fra og med fylte 65 år.
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
- Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet: [fhi.no/influensa](http://fhi.no/influensa)

### Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.

### Dosering til voksne og barn

Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært og levende svekket vaksine gitt som nesespray.



### Asasantin Retard og Persantin Retard er avregistrert

Asasantin Retard ble avregistrert i juli og Persantin Retard i september. For begge er det likeverdige legemidler tilgjengelig som kan brukes i stedet.

Asasantin Retard inneholdt virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre og ble brukt som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall (TIA).

Persantin Retard inneholdt virkestoffet dipyridamol og ble brukt som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA, enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.

**Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel til Asasantin Retard, og kan brukes i stedet.**

**Aponova er et likeverdig legemiddel til Persantin Retard, og kan brukes i stedet.**

Hvis likeverdige legemidler ikke er tilgjengelig er det svært viktig at berørte pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt må spesialister som indremedisinere, hjertespesialister og nevrologer konsulteres.