

# Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes und  
des Reichsverbandes Deutscher Entomologen-Vereine

26. Jahrgang.

8. November 1932.

Nr. 30.

---

**Inhalt:** G. Calliess: Niepelt 70 Jahre. — Röber: Zusammenstellung der Publikationen von Wilh. Niepelt. — Wehrli: Neue ostasiatische Geometriden-Arten und -Rassen aus meiner Sammlung. (Lepid. Heteroc.). — Prof. M. Draudt: Zu: *Cheligalea fuchsiana* Ev. = *Cucullia scopariae* Dörfm. — Aus den Sitzungsberichten der Entomologischen Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg. — Literaturbericht.

---

## Wilhelm Niepelt 70 Jahre.

Am 10. November d. J. begeht Wilhelm Niepelt in Zirlau b. Freiburg (Schles.) seinen 70. Geburtstag. Welcher Entomologe hätte nicht seinen Namen schon gehört? Weit über die Grenzen des Deutschen Reiches hinaus ist er bekannt. Wir freuen uns daher, ihn unsern Lesern im Bilde zeigen zu können.



Wilhelm Niepelt wurde am 10. November 1862 in Striegau i. Schlesien geboren, wo sein Vater eine Gastwirtschaft besaß. Hier besuchte Wilhelm zuerst die Volksschule und vom 9. Jahre ab die in Freiburg i. Schl., wohin seine Eltern verzogen. Schon als Knabe zeigte Niepelt eine große Vorliebe für die Schmetterlinge. Er sammelte eifrig in der schönen Umgebung von Freiburg, auf den Wiesen und in den Wäldern, die eine reiche Insektenfauna führten. Mit dem 14. Lebensjahre erlernte er das Buchbinderhandwerk, und mit dem 18. Lebensjahre, nach Beendigung seiner Lehrzeit, zog er, den Ranzen auf dem Rücken, zu Fuß in die Fremde. In Kassel nahm er Arbeit und diente auch seine Militärzeit ab. Auch hier fand er in Begleitung von H. Auel (jetzt in Potsdam) Gelegenheit zum Sammeln. Die Umgebung, sowie der Habichts- und der Kauffungerwald boten gute Fangplätze. Besonders angeregt wurde Niepelt in Kassel durch die Bekanntschaft mit dem Oberförster i. R. v. Vulté, der, im Besitze einer großen Sammlung, ihm ein guter Lehrmeister war. Auf Anregung des Kunsthändlers Ed. Honrath-Berlin unternahm Niepelt 1886 zu Sammelzwecken eine Reise nach Cuba. In Santiago de Cuba war ihm die Bekanntschaft mit Dr. Gundlach von Nutzen. Mit guter Ausbeute von der Ostküste Cubas kehrte Niepelt nach Deutschland zurück und nahm seinen Wohnsitz in Zirlau bei Freiburg i. Schl., wohin seine Eltern gezogen waren, und wo Niepelt heute noch wohnt. Hier ging er an die Einrichtung einer Werkstatt für entomologische Geräte, die sich bald des besten Rufes erfreute, und ließ es sich vor allem angelegen sein, seine Kenntnisse in der Entomologie zu erweitern und zu vertiefen, sowie seine Sammlungen zu vervollständigen. Im Jahre 1906 regte er eine Sammelexpedition nach dem Innern Ecuadors an und unterstützte sie ganz erheblich. Die Ausbeute war gut und ergab viele Neuheiten. In der Lepidoptera Niepeltiana sind diese im Verein mit Dr. E. Strand, damals in Berlin, veröffentlicht. Im Laufe der Jahre waren Niepelts Sammlungen außerordentlich gewachsen an Zahl der Stücke und an Wert. Reichlich hat er dazu beigetragen, aus seinen umfassenden Beständen die Sammlungen des Zoolog. Instituts der Universität Breslau zu vervollständigen, und stand im regen Verkehr mit Prof. Kückenthal und Dr. Zimmerdasselbst. Groß ist auch die Zahl seiner entomologischen Publikationen, wie uns die nachfolgende Zusammenstellung zeigt.

So kann Niepelt an seinem 70. Geburtstage auf ein inhaltreiches Leben voll Fleiß, Ausdauer und Arbeitsamkeit zurückblicken. Sein Name hat in der Entomologie einen guten Klang. Wir wünschen ihm zu seinem 70. Geburtstage für die Zukunft weitere beste Gesundheit, Arbeits- und Schaffenskraft besonders auch für die ihm so liebe Entomologie.

G. Calließ

**Zusammenstellung der Publikationen von Wilh. Niepelt.**

(Fast allen Arbeiten sind Abbildungen beigegeben.)

- Eine neue *Caia*-Form: *Arctia caia* L. var. *phantasma*. Ins.-Börse XXII (1905); Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 5.
- Seltene Aberrationen von *Arctia caia* L. und *Arctia villica* L. Berl. Ent. Z. LIII (1908), p. 193—194; Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 6.
- Neue paläarktische Macrolepidopteren. Int. Ent. Z. V (1911), p. 274, 275. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 7.
- Xanthospilopteryx zeodita* nov. spec. Ins.-Börse XXIII (1906). Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 9.
- Pergesa* (*Chaerocampa*) *elpenor* L. forma *Daubi* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 12.
- Perisomena caecigena* *Kupido* f. *Wiskotti* Niepelt n. f. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 19.
- Alcidis* *Ribbei* Pagenst. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 21.
- Castnia* (*Gazera*) *Strandi* Niepelt n. sp. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 24.
- Zwei neue *Agrias*-Formen. Int. Ent. Z. IV (1910), p. 188. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 29.
- Agrias phoenix* Niepelt und *Agrias croesus* Staudgr. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 29.
- Agrias sardanapalus* Bates forma *decyanea* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 30.
- Agrias phoenix* Niep. und *Agrias croesus* Staudgr., *Agrias semirubra* Niep. Iris 25, p. 1—4.
- Eine neue *Agrias*-Form. Int. Ent. Z. VII (1913), p. 201. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 31.
- Agrias amydon* forma *aristoxenus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 31.
- Prepona praeneste* Hew. forma *confusa* Niepelt f. n. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 32.
- Charaxes* (*Eulepis*) *epigenes* ♂ Godm. u. Salv. forma *monochromus* Niepelt f. n. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 32.
- Charaxes Homeyeri* Dewitz f. *bellus* Niepelt n. f. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 33.
- Euphaedra wissmanni* nov. spec. Int. Ent. Z. XX (1904), Nr. 4. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 33.
- Euphaedra Aurivillii* Niepelt n. sp. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 34.
- Catagramma cyllene* Doubl.-Hew. f. *Oberthüri* Niepelt n. f. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 35.
- Neue exotische Lepidopteren. Iris 1911.
- Kallima rumia* Westw. forma *kassaiensis* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 36.
- Catoplepia rivalis* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 37.
- Morpho Sulkowskyi* Koll. forma *sirene* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 37.

- Morpho amor Westw. ♀. Int. Ent. Z. VII (1913), p. 97.
- Morpho aurora Westw. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 38.
- Neue südamerikanische Tagfalter. Int. Ent. Z. VII (1913), p. 121.
- Morpho aurora Westw. ♀ forma splendoris Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 38.
- Zwei neue Formen der Gattung Heliconius. Berl. Ent. Z. LII (1907), p. 208—210. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 38.
- Neue Formen der Gattung Heliconius. D. Ent. Z. 1908, p. 505—506.
- Weitere Formen der Gattung Heliconius. Strand, Lepid. Niepelt., I, p. 39.
- Neue Heliconius-Formen. Berl. Ent. Z. LIV (1909), p. 103—105.
- Heliconius melpomene aglaope forma fraterna Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 40.
- Heliconius melpomene aglaope forma gratiosa Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 41.
- Heliconius erato estrella forma Rothschildi Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 41.
- Zwei neue Formen der Gattung Heliconius Latr. Societ. Ent. XXII, p. 42. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 41.
- Dismorphia lycosura Hev. f. ecuadorensis Niepelt n. subsp. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 45.
- Pereute Swainsoni Gray ♀ forma albosignata Niepelt f. n. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 45.
- Colias Staudingeri f. Kükenthali Niepelt f. n. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 45.
- Neue südamerikanische Papilionen. Berl. Ent. Z. LII (1907), p. 208—210.
- Papilio bachus belsazar Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 50.
- Neue südamerikanische Papilionen. Berl. Ent. Z. LIV (1909), p. 103—105.
- Papilio Neyi Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 50.
- Seltene und bisher unbekannte ♀♀ südamerikanischer Papilionen. Berl. Ent. Z. LII (1907), p. 208—210.
- Papilio ascolius zalates Godm. u. Salv. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 51.
- Neue südamerikanische Papilionen. Berl. Ent. Z. LII (1907), p. 210—212.
- Papilio xynias xisuthrus Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 52.
- Papilio harmodius xeniades Hew. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 52.
- Papilio harmodius xeniades Hew. ♀ forma jarbas Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 52.
- Papilio trapeza R. u. J. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 52.
- Papilio euryleon anatmus forma punctata Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 53.
- Papilio Weymeri Niepelt ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 53.
- Eine neue Ornithoptera-Form von Neu-Guinea. Int. Ent. Z. VI (1913), p. 281.

- Papilio* (Ornithoptera) *supremus* Rüb. forma *samson* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 54.
- Zwei neue Formen von *Parnassius delphius* Eversm. Iris 25, p. 132.
- Parnassius delphius* Eversm. ab. *nox* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 55.
- Parnassius delphius* Eversm. ab. *immarginata* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 55.
- Parnassius patricius* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 56.
- Eine neue *Parnassius*-Form. Int. Ent. Z. V (1912), p. 305.
- Parnassius actius* Eversm. ab. *mirandus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 56.
- Parnassius apollo friburgensis* Niepelt n. subsp. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 57.
- Parnassius mnemosyne silesiacus* Fruhst. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. I, p. 58.
- Coscinocera hercules omphale* Butler ♀. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 5.
- Argynnis paphia* L. *valesina* Esp. ab. *atrox* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 7.
- Euphaedro medon* L. subsp. *Neustetteri* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 7.
- Colaenis tithraustes* Fabr. var. *diaphana* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 8.
- Amphirena superba* Bates ab. *azurita* Niepelt nov. ab. Strand, Lepid. Niepelt II, p. 8.
- Apaturina erminea* Cr. forma *kietana* Niepelt n. f. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 8.
- Agrias amydon* Hew. forma *aristoxenus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 8.
- Timelaea formosana* Fruhst. var. *confluana* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 8.
- Charaxes fabius* F *sulphureus* Rothsch. u. Jord. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 8.
- Heliconius cydno* Doubl.-Hew. ab. *Larseni* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 13.
- Elymniopsis bammakoo* Westw. var. *hybrida* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 13.
- Catasticta suasa* Stdgr. *suasella* Rüb. (Hermaphrodit!). Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 14.
- Hirsutis pinthias* Godm. u. Salv. f. *macasica* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 15.
- Dismenitis zygia* Godm. u. Salv. var. *caesioptica* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 15.
- Thecla quercus* L. var. *violacea* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 18.
- Papilio* (Troides) *Allotteri* Rothschild. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 20.
- Papilio bitias* Hew. v. *marcus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 21.

- Papilio lycophron* Hb. ab. *delunensis* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 21.
- Papilio oritas* Godm. u. *Salv. f. albador* Niepelt ♀. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 21.
- Papilio polyctor* Bsd. ab. *alarich* Niepelt nov. ab. ♂. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 21.
- Papilio euryleon clusoculis* Butl. ♀. Strand Lepid. Niepelt. II., p. 21.
- Papilio ridleyanus* White var. *fumatus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 23.
- Papilio chiansiades* Westw. ♀. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 23.
- Papilio belus chrysomaculatus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 24.
- Papilio lycidas* Cr. f. *adlatus* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 24.
- Parnassius tenedius* Eversm. var. *nigromaculata* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, p. 25.
- Antheraea gschwandneri* Niepelt n. sp. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Parnassius discobolus* Alph. ab. *lacrimans* Marschner. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Catagramma texa* Hew. var. *textotitania* Strand. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Callicore wernickei* Niepelt. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Satyrus dehradunensis* Niepelt n. sp. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Colias aurora* Esp. var. *philippsi* Niepelt n. var. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Papilio janaka* Moore var. *pseudobootes* Niepelt n. var. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Papilio xuthulus* Brem. ab. *flaveus* Niepelt n. var. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Parnassius apollo* L. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Parnassius discobolus* Alph. ab. *lacrimans* Marschner. Strand, Lepid. Niepelt. II, Nachtrag.
- Beitrag zur Kenntnis der Ornithoptera *alottei* Rothschild. Ent. Rundschau 1916, p. 3.
- Neue Formen palaearktischer und exotischer Lepidopteren. Int. Ent. Z., 17. Jahrg., p. 133.
- Ein Neuer *Papilio* von Halmaheira. Int. Ent. Z., 18. Jahrg., p. 69.
- Neue Formen exotischer Rhopaloceren. Int. Ent. Z., Jahrg. 18, p. 189.
- Neue Nymphalide von Columbien. Ent. Rundschau 1925, p. 7.
- Pergesa elpenor* ab. *lugens* m. n. ab. Int. Ent. Z. 20. Jahrg., p. 61.
- Wenig Bekanntes über kolumbische Morphiden. Int. Ent. Z., 20. Jahrg., p. 83.
- Nachtrag und Berichtigung zu „Neue und wenig bekannte südamerikanische Tagfalter“ Int. Ent. Z. 20. Jahrg., p. 137.

- Neue Formen indo-malayischer Rhopaloceren. Int. Ent. Z. 20. Jahrg., p. 156.
- Zwei neue indo-australische Saturniden. Int. Ent. Z. 20. Jahrg., p. 257.
- Neue Morpho-Formen von Columbien. Int. Ent. Z. 20. Jahrg., p. 329.
- Zwei neue südamerikanische Saturniden. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 1.
- Neue exotische Rhopaloceren. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 49.
- Id. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 104.
- Id. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 180.
- Neue Falter von Columbien. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 239, 390.
- Neue Rassen von Morpho theseus Deyr. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 252.
- Eine neue Sphingiden-Form von Südamerika. Int. Ent. Z. 21. Jahrg., p. 434.
- Eine neue Heliconius-Form. Int. Ent. Z. 22. Jahrg., p. 56.
- Eine neue Saturniiden-Form. Int. Ent. Z., 22. Jahrg., p. 187.
- Neue Heliocoonius-Formen von Columbien. Int. Ent. Z. 22. Jahrg., p. 305.
- Neue Formen exotischer Lepidopteren. Int. Ent. Z. 24. Jahrg., p. 485.
- Eine neue Hybride aus der Gattung Antheraea. Int. Ent. Z. 24. Jahrg., p. 504.
- Eine neue melanistische Form von Endromis versicolora. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 83, 145.
- Ein neuer Sphingiden-Hybrid aus der Gattung Celerio Oken. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 181.
- Eine neue Sphingiden-Form. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 278.
- Eine neue Form von Gastropacha quercifolia. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 301.
- Ein neuer Sphingiden-Hybrid. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 360.
- Eine neue amerikanische Saturniiden-Form. Int. Ent. Z. 25. Jahrg., p. 465.
- Eine neue Castnia-Rasse. Int. Ent. Z. 26. Jahrg., p. 65.
- Neue orientalische Saturniiden. Int. Ent. Z. 26. Jahrg., p. 89.
- Eine neue Aberration von Tropaea luna L. Int. Ent. Z. 26. Jahrg., p. 92.
- Ein neuer Hybrid der Gattung Celerio Ok. Int. Ent. Z. 26. Jahrg., p. 280.
- Neue Formen südamerikanischer Tagfalter. Soc. ent. 30. Jahrg., p. 63.
- Papilio bridgei Math. ab. gorei Ribbe ♂. Soc. ent. 32. Jahrg., p. 34.
- Neue Falter. Ent. Z. 44. Jahrg., p. 18. J. Röber.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Calließ [Galliess] Gustav

Artikel/Article: [Wilhelm Niepelt 70 Jahre. 327-333](#)